- Contrôle continu de Mathématiques du Web -

- Durée : 1 heure 30 -

Aucun document autorisé, barème indicatif

- Exercice 1 - HITS - 8 points

Au cours de cet exercice, on considère la portion suivante du graphe du web. On note D ce graphe orienté.

Une recherche utilisant l'algorithme de Hits est lancée sur D .

1. Si A désigne la matrice d'adjacence du graphe D , on rappelle que la matrice 'authority' de D est la matrice ${}^t A.A$. Donner l'interprétation graphique (*i.e.* sur le graphe) des coefficients de cette matrice.
2. Calculer la matrice 'authority' de D .
3. Calculer le score et le classement 'authority' pour la requête effectuée (on donnera le score sous forme d'un vecteur x , pas forcément normé, dont les coordonnées sont les scores des pages impliquées).
4. Pour une matrice carrée B quelconque, montrer que si x est vecteur propre de ${}^t B.B$ pour la valeur propre λ , alors Bx est vecteur propre de $B.{}^t B$ pour la même valeur propre λ .
5. En déduire, en un seul calcul vectoriel, le score et le classement 'hub' de la requête.

- Exercice 2 - Question de cours/tp - 4 points

On considère une variable aléatoire entière X dont la loi de probabilités est donnée par la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ (*i.e.* pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $P(X = k) = u_k$).

Écrire en pseudo-code (type C) une procédure permettant de simuler le tirage aléatoire d'une valeur suivant la loi de X . On pourra faire appel à une fonction `rand()` renvoyant un réel choisi uniformément entre 0 et 1.

- Exercice 3 - Modèle aléatoire de graphe - 8 points

On considère le modèle aléatoire suivant : pour construire le graphe G sur les sommets $\{1, \dots, n\}$, on ajoute les arêtes $\{\{i, i+1\} : i = 1, \dots, n-1\} \cup \{1, n\}$ pour obtenir un cycle, puis pour chaque sommet i on ajoute l'arête $\{i, x_i\}$ où x_i est choisi uniformément dans $\{1, \dots, n\} \setminus i$. On autorise les arêtes doubles et triples mais on n'en tiendra pas compte dans les calculs.

1. Justifier rapidement que pour tout i , on ait $d(i) \geq 3$, où $d(i)$ désigne le degré de i dans le graphe G , et que pour tout $j \neq i$, on ait $P(x_j = i) = \frac{1}{n-1}$.

2. En déduire, la loi de degré du sommet i , c'est-à-dire, calculer pour tout $k \geq 0$ la valeur de $P(d(i) = k + 3)$.
3. De quelle loi classique cette distribution de degré se rapproche-t-elle? Rapidement, à votre avis, que dire quand n devient très grand?
4. Donner le degré moyen dans le graphe G .
5. Dans cette question, on veut montrer que le diamètre du graphe est inférieur à $\frac{3}{2}\sqrt{n}$ en moyenne. Pour deux sommets i et j du graphe G , on note $d(i, j)$ la distance de i à j , c'est-à-dire la longueur d'un plus court chemin de i à j .
 - (a) Soit i un sommet, on définit $B(i) = \{j : d(i, j) \leq \frac{1}{2}\sqrt{n}\}$. Justifier que $|B(i)| \geq \sqrt{n}$. Pour un sommet $j \notin B(i)$, calculer la probabilité que $x_j \in B(i)$, en fonction de $|B(i)|$.
 - (b) Soit k un sommet hors de $B(i)$, et $P = p_1, \dots, p_q$ un chemin de $p_1 = i$ à $p_q = k$. On suppose que $p_j \in B(i)$ pour $j = 1, \dots, l$ et que $p_j \notin B(i)$ pour $j = l+1, \dots, q$. Calculer le nombre moyen de sommet p_j avec $j > l+1$ ayant un voisin dans $B(i)$.
 - (c) *Hors-barême* Conclure, qu'en moyenne, la distance entre i et k est inférieure ou égale à $\frac{3}{2}\sqrt{n}$.